Coléoptères de l'Amérique Méridionale

par M. Pic

Cephalolia rufipes n. sp. — Elongata, subparallela, sat deplanata, nitida, nigra, pedibus rufis.

Allongé, subparallèle, assez déprimé, brillant, noir avec les pattes rousses, dessus presque glabre, dessous à pubescence blanche, plus dense sur l'abdomen. Tête plus étroite que le prothorax, creusée entre les yeux, à ponctuation petite et peu rapprochée; antennes robustes; prothorax en peu plus large que long, presque tronqué droit en avant avec les angles antérieurs à peine avancés, presque droit et étroitement rebordé sur les côtés, apparaissant vagement marginé de brun sous un certain jour, à ponctuation forte, irrégulièrement éparse; écusson large, presque lisse; élytres peu plus larges que le prothorax, subparallèles, rebordés sur les côtés, subarrondis au sommet et un peu dépassés par le pygidium, assez fortement et un partie irrégulièrement ponctués à la base après avec des rangées de points, s'obliterant au sommet, plus faibles vers la suture avec extérieurement les intervalles un peu et diversement surélevés. — Long. 5 mill. Brésil (coll. Bruch).

Voisin de C. *depressa* Baly, en diffère par l'aspect plus brillant, la ponctuation et la coloration des pattes différentes.

Allecula Bruchi n. sp. — Elongata, parum nitida, breve griseo pubescens, rufa, pro parte picea,, elytris vage subaeneis.

Allongé, peu brillant, revêtu d'une fine pubescence grise, assez espacée, en majeure partie roussâtre, obscurci par places avec les élytres à vages reflets bronzés. Tête plus large que le debout du prothorax, densément et reguleusement ponctuée comme le prothorax, yeux grands et saillants, écartés; antennes assez longues et grêles; prothorax très peu plus long que large, subsinué sur les côtés, sans impressions nettes, angles antérieurs nuls, postérieurs droits; élytres bien plus larges que le prothorax, subsinués sur les côtés, atténués à l'extrémité, assez longs, strié-ponctués, intervalles subconvexes, un peu granuleux; pattes en partie foncées, en partie rousses, assez longues, cuisses peu épaisses, tibias grêles. — Long. 8-9 mill. Rép. Argentine: La Cienega (Weiser, in coll. Bruch et Pic).

Espèce très distincte par sa forme relativement allongée, l'avant-corps étroit par rapport aux élytres. Peut se placer près de *A. neglecta* Borch.

La variété nouvelle **saladosa** a l'avant-corps roux, concolore, les élytres foncés, moins larges par rapport au prothorax avec la ponctuation des stries plus forte. Rép. Argentine: Santiago del Estero (Wagner, in coll. Pic).

Lygistopterus griseolineatus n. sp. — Oblongus, fere opacus, griseo pubescens et obscure hirsutus, niger, elytris pallidioribus, labro, antennis ad basim humeris et femoribus ad basim diverse rufis; elytris griseo lineatis.

Oblong, presque opaque, densément ponctué sur l'avant-corps, orné des longs poils dressés foncés et d'une pubescence grise courte, assez dense, formant des lignes longitudinales étroites sur les élytres, noir, les élytres étant moins foncés avec le labre, la base des antennes et des femurs ainsi que les épaules rousses. Tête assez longue, bien plus étroite que le prothorax; antennes assez longues et grêles, à derniers articles allongés; prothorax court et large, dilaté-arrondi antérieurement, un peu étranglé vers la base avec les angles postérieurs dentés, ayant 2 petites dents sur les côtés, vers le milieu; élytres plus larges que le prothorax, courts, atténués á l'extrémité, sans stries appréciables et ponctuation très fine avec des rangées de granules pileuses sur les intervalles des lignes pubescentes; pattes pas très robustes. — Long. 8 mill. Rép. Argentine: Sierras de Córdoba (C. Bruch, in coll. Bruch et Pic).

Espèce très distincte par la disposition ou rengées de la pubescence élytrale.